



Schweinehaltung

- Höhere Fruchtbarkeitsleistung
- Geringere Mortalität

Schweinemast

- Schnelleres Erreichen des Mastendgewichtes nach ca. 85 – 87 Tagen durch höhere Tagesgewichtszunahme
- Durch die Optimierung des pH-Wertes in allen tierischen Zellen erhält das Fleisch eine signifikante Qualitätsverbesserung
- Verkürzung der Amortisationszeit
- Futtereinsparung

Ferkelaufzucht

- Höhere Tagesgewichtszunahme bei gleicher Fütterung
- Optimierung der Fruchtbarkeitsleistungen



Anwendung von animamineral® Schwein

- Tägliche Fütterung
- Etwa 1 – 1,5% je Kilogramm Trockensubstanz der täglichen Fütterung
- Keine Änderung der gewohnten Futterzusammensetzung

Mögliche Vorteile für den Landwirt

- Steigerung der Vitalität der Tiere
- Verbesserung der Krankheitsresistenz
- Reduktion kannibalischen Verhaltens (Schwanzbeißen)
- Reduzierte Geruchbelästigung im Stall
- Minimierte Ammoniakbelastung durch reduzierte Entstehung von NH₃
- Geringere Mortalität
- Höheres Einkommen durch kürzere Belegungszeiten Bessere Fleischqualität
- Kostenersparnis durch höhere Futtereffizienz
- Geringere Veterinärkosten